



# Command® | erbicid

Erbicid selectiv preemergent pentru combaterea buruienilor cu frunză lată din culturile de rapiță.

<b>SUBSTANȚĂ ACTIVĂ</b>	clomazonă 480 g/l
<b>FORMULARE</b>	concentrat emulsionabil (EC)
<b>CERTIFICAT DE OMOLOGARE ÎN ROMÂNIA</b>	Nr. 1595 din 18.05.1995

## AVANTAJE:

- Erbicid sistemic cu efect pelicular cu aplicare preemergentă.
- Selectivitate pentru planta din cultură.
- Eficacitate împotriva buruienilor cu frunză lată care concurează planta de cultură.
- Controlează buruienile încă de la începutul perioadei de vegetație, când cultura este sensibilă.

Produsul Command® este omologat pentru:

CULTURĂ	ORGANISM ȚINTĂ	DOZĂ/HA
Rapiță	Buruieni dicotiledonate anuale și unele monocotile	0,15 - 0,25 l/ha preemergent (în funcție de tipul de sol, aplicat singur sau asociat)

## MOD DE ACȚIUNE:

- Command® este un erbicid selectiv, pelicular pentru rapiță, cu acțiune sistemică care se aplică preemergent pentru controlul buruienilor anuale cu frunză lată și a unor buruieni monocotile anuale. Este absorbit prin frunze și rădăcini și translocat în întreaga plantă.
- La trecerea buruienilor în curs de răsărire, prin pelicula formată pe sol, buruienile absorb erbicidul care determină modificări ireversibile la nivelul celulelor, blocarea sintezei pigmentilor verzi, manifestate prin îngălbenire, urmată de necroză și în final moartea acestora.

## MOD DE UTILIZARE:

- Aplicați produsul Command® pe un sol bine lucrat pentru a permite realizarea unei pelicule compacte și omogene.
- Erbicidul Command® nu necesită încorporare decât în toamnele cu deficit de umiditate. În această situație se recomandă o încorporare ușoară la 2 - 4 cm, urmată de lucrarea de semănat sau o udare de răsărire.

- Administrați produsul Command® în 200 - 400 l apă/ha.
- Command® are un nivel bun de control asupra unor buruieni crucifere și poligonacee.
- Pentru combaterea unui spectru mai larg de buruieni cu frunză lată și graminee, se recomandă amestecul în rezervor cu erbicidul Successor® Pro.
- Rotația culturilor după aplicarea produsului Command® nu este restricționată.
- În caz de compromitere a culturii din diferite cauze, se poate semăna:
  - după o lucrare superficială la 8 - 10 cm adâncime, după 1 lună de la aplicare: rapiță, morcov, fasole, varză, mazăre, după 4 luni de la aplicare: cereale, bob, după 10 luni: sfeclă;
  - după o lucrare de arat la minim 25 cm adâncime se poate semăna: după 1 lună de la aplicare: rapiță, morcov, fasole, varză, mazăre, lupin, soia; după 4 luni de la aplicare: cereale, in, bob, porumb, floarea-soarelui, ceapă, salată, tomate.

#### SPECTRUL DE BURUIENI COMBĂTUTE:

<i>Abutilon theophrasti</i> (teișor)	<i>Lapsana communis</i> (zgrabunțica)
<i>Aethusa cynapium</i> (pătrunjelul câinelui)	<i>Matricaria chamomilla</i> (mușețel)
<i>Apera spica-venti</i> (iarba vântului)	<i>Myosotis arvensis</i> (nu-mă-uita)
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (traista ciobanului)	<i>Poa annua</i> (firuța)
<i>Centaurea cyanus</i> (albăstrița)	<i>Polygonum spp.</i>
<i>Chenopodium album</i> (lobodă albă)	<i>Sisymbrium sophia</i> (voinicică)
<i>Galeopsis spp.</i> (lingurică)	<i>Solanum nigrum</i> (zarna)
<i>Galium aparine</i> (turița)	<i>Stellaria media</i> (rocoină)
<i>Geranium spp.</i> (ciocul berzei)	<i>Thlaspi arvense</i> (punguliță)
<i>Lamium spp.</i> (urzică moartă)	<i>Veronica spp.</i>



FMC și Command® sunt mărci comerciale ale FMC Corporation și / sau ale unui afiliat.