



Evorelle® Express™ | erbicid

Erbicid selectiv pentru combaterea în postemergență a buruienilor cu frunză lată la hibridii de floarea-soarelui toleranți la Evorelle® Express™.

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ	tribenuron metil 375 g/kg + tifensulfuron metil 125 g/kg
FORMULARE	granule solubile (SG)
CERTIFICAT DE OMOLOGARE ÎN ROMÂNIA	Nr. 506 PC din 14.03.2019

AVANTAJE:

- Tehnologia de cultivare a hibridilor de floarea-soarelui toleranți la erbicidul Evorelle® Express™ este una dintre cele mai inovatoare soluții de creștere a productivității în agricultură.
- Spectru foarte larg de combatere, control eficient al buruienilor cu frunză lată inclusiv pălămidă (*Cirsium arvense*), cornaci (*Xanthium spp.*), ciumăfaie (*Datura stramonium*) din culturile de floarea-soarelui rezistente la Evorelle® Express™.
- Flexibil în aplicare de la răsărire, până la 8 frunze ale florii-soarelui.

Produsul Evorelle® Express™ este omologat pentru:

CULTURĂ	ORGANISM ȚINTĂ	DOZĂ/HA
Floarea-soarelui (hibridii cu genă rezistentă la Evorelle® Express™)	Buruieni cu frunză lată, anuale și perene	30-60 g/ha + 250 ml Trend® 90 în stadiul de 2 - 8 frunze ale culturii (BBCH 12-18), buruieni la 2-4 frunze

MOD DE ACȚIUNE:

- Erbicidul Evorelle® Express™ este absorbit prin frunze și este translocat rapid în întreaga plantă. Substanța activă inhibă diviziunea celulară în vârfurile de creștere ale lăstarilor și rădăcinilor plantelor sensibile.
- Creșterea buruienilor este oprită după câteva ore de la aplicare, dar simptomele vizibile apar abia după 5-10 zile și moartea se produce după 15-25 zile.

MOD DE UTILIZARE:

- Eficacitatea maximă se obține în faza de 2-4 frunze a buruienilor cu frunză lată anuale și în faza de rozetă a celor perene.
- Tratamentele se efectuează în postemergență de la 2 frunze până în stadiul de 8 frunze ale florii-soarelui (BBCH12-18).
- Asocierea cu surfactantul Trend® 90 permite o mai bună translocare a produsului și o acțiune mai rapidă.

- Nu aplicați produsul la temperaturi de sub 10°C sau peste 30°C.
- Pentru evitarea fenomenelor de fitotoxicitate la amestecul în rezervor cu erbicide antigramineice, se recomandă aplicarea separată a erbicidelor la minim 7 zile între tratamente.
- Evitați aplicarea produsului peste culturile aflate sub stres cauzat de frig, secetă, exces de umiditate, dăunători sau atac de boli, deficit de nutrienți.
- Volumul de soluție: 200 – 400 l/ha.

ATENȚIE CULTIVATORII!

- Erbicidul Evorelle® Express™ poate fi folosit numai la hibridii toleranți la acest erbicid.
- Nu se recomandă utilizarea produsului Evorelle® Express™ în solele însămânțate cu hibridi ce conțin altă genă de rezistență.

SPECTRUL DE BURUIENI COMBĂTUTE LA DOZA DE 60 G/HA:

BURUIENI SENSIBILE	<i>Myagrurn perfoliatum</i> (golicică)
<i>Abutilon theophrasti</i> (teișor)	<i>Myosotis arvensis</i> (nu mă uita)
<i>Agrostemma githago</i> (neghina)	<i>Oxalis</i> spp. (măcriș)
<i>Amarantus retroflexus</i> (știr)	<i>Papaver rhoeas</i> (mac)
<i>Ambrosia artemisiifolia</i> (iarba pălloagelor)	<i>Phacelia tanacetifolia</i> (facelia)
<i>Anthemis</i> spp. (romaniță)	<i>Polygonum</i> spp. (iarba roșie)
<i>Artemisia vulgaris</i> (pelinăriță)	<i>Portulaca oleracea</i> (grașiță)
<i>Atriplex</i> spp. (loboda sălbatică)	<i>Ranunculus</i> spp. (piciorul cocoșului)
<i>Bifora radians</i> (puciognă)	<i>Rapistrum rugosum</i> (ciurlan)
<i>Brassica nigra</i> (muștar negru)	<i>Raphanus raphanistum</i> (ridiche sălbatică)
<i>Brassica oleifera</i> (samulastra de rapiță)	<i>Rumex</i> spp. (măcriș)
<i>Cannabis sativa</i> (cânepă)	<i>Senecio vulgaris</i> (spălăcioasa)
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (traista ciobanului)	<i>Sinapis arvensis</i> (muștar sălbatic)
<i>Centaurea cyanus</i> (albăstrița)	<i>Sisymbrium sophia</i> (voinicică)
<i>Chenopodium</i> spp. (lobodă)	<i>Solanum nigrum</i> (zârna)
<i>Chrysanthemum segetum</i> (vetricea)	<i>Sonchus oleraceus</i> (susai)
<i>Cirsium arvense</i> (pălămidă)	<i>Spergula arvensis</i> (hrana vacii)
<i>Datura stramonium</i> (ciumăfaia)	<i>Stachys annua</i> (cinstet)
<i>Daucus carota</i> (morcov sălbatic)	<i>Stellaria media</i> (rocină)
<i>Descurainia</i> spp. (voinicică)	<i>Sylibum marianum</i> (armurariu)
<i>Diplotaxis</i> spp. (puturoasă)	<i>Taraxacum officinalis</i> (păpădie)
<i>Erodium cicutarium</i> (pliscu cocorului)	<i>Thlaspi arvense</i> (punguliță)
<i>Galeopsis tetrahit</i> (lungurică)	<i>Veronica</i> spp. (șopârliță)
<i>Galinsoga parviflora</i> (busuioc sălbatic)	<i>Vicia</i> spp. (măzărliche)
<i>Geranium</i> spp. (ciocul berzei)	<i>Viola</i> spp. (trei frați pătați)
<i>Helianthus annuus*</i> (floarea-soarelui samulastră)	<i>Xanthium</i> spp. (cornaci)
<i>Hibiscus trionum</i> (zămășiță)	BURUIENI MEDIU SENSIBILE
<i>Lactuca seriola</i> (salată sălbatică)	<i>Anagallis arvensis</i> (scânțeuța)
<i>Lamium</i> spp. (urzica moartă)	<i>Convolvulus arvensis</i> (volbură)
<i>Linaria</i> spp. (linarita)	<i>Galium aparine</i> (turiță)
<i>Lithospermum arvense</i> (mărgelușe)	BURUIENI REZISTENTE
<i>Matricaria</i> spp. (mușetel)	<i>Fumaria officinalis</i> (fumăriță)
<i>Medicago sativa</i> (lucerna samulastră)	Toate speciile de graminee
<i>Mercurialis annua</i> (trepădătoare)	

* samulastra din hibridi de floarea-soarelui convenționali, nerezistenți la EVORELLE® EXPRESS™ sau imazamox.

FMC și Evorelle® Express™ sunt mărci comerciale ale FMC Corporation și / sau ale unui afiliat.