



Fertilizant foliar pentru culturile de crucifere, leguminoase, floarea-soarelui și porumb.

ÎNGRĂȘĂMÂNT ANORGANIC LICHID COMPUS CU MACROELEMENTE ȘI OLIGOELEMENTE N:5 S (11) B-Mn-Mo-Zn (3-7-1-5)

		% g/g	g/l
COMPOZIȚIE	Azot ureic (N)	4.1	60
	Sulf (S)	11.2	164
	Bor (B)	3.5	51
	Mangan (Mn)	6.3	92
	Molibden (Mo)	0.3	4.4
	Zinc (Zn)	4.9	71
FORMULARE	SC, Suspensie concentrată		
PH	8 - 9		
DENSITATE	1,44 - 1,48 g/cm ³		

MOD DE ACȚIUNE:

- Fertilizantul Rapsin™ este o combinație unică din macroelemente azot (N), sulf (S) și oligoelemente bor (B), mangan (Mn), molibden (Mo) și zinc (Zn) pentru fertilizarea foliară a culturilor de rapiță, varză și alte culturi crucifere, porumb, floarea-soarelui, culturi leguminoase (mazăre, fasole, soia, naut, lupin, linte).
- Formularea prezintă caracteristici unice, care permit compatibilitatea mai bună cu amestecurile din rezervor, acoperirea și aderență maximă pe frunze. Această compoziție a produsului îmbunătățește compatibilitatea cu amestecurile din rezervor, mărește aderența, absorbția și translocarea elementelor nutritive în plantă.

MOD DE UTILIZARE:

- A se utiliza exclusiv în caz de necesitate recunoscută. A nu se depăși dozele adecvate.
- Fertilizantul Rapsin™ este recomandat pentru utilizare la culturile crucifere, leguminoase, floarea-soarelui și porumb. Se aplică de câte ori este necesar aportul suplimentar de substanțe nutritive, ușor asimilabile. Se recomandă aplicarea a 1-2/3 tratamente la interval de 10-14 zile.
- În cazul culturilor afectate de condiții climatice nefavorabile (secetă, grindină etc.), atac puternic de boli sau dăunători se recomandă aplicarea a 1-2 tratamente succesive la interval de 10-14 zile pentru refacerea culturilor.



- A nu se pulveriza în condiții de lumina puternică a soarelui (insolație) și la temperaturi de peste 25° C. Dacă este posibil, pulverizați seara sau dimineața devreme pentru rezultate optime.

Doze recomandate:

- **Rapiță:** 1 l/ha;
- **Floarea-soarelui:** 1-1,5 l/ha;
- **Porumb:** 1-3 l/ha;
- **Varză, conopidă, brocoli, ridiche (vărzoase):** 1-3 l/ha;
- **Mazăre, fasole, soia, lupin, năut (leguminoase):** 1-3 l/ha.

Momentul de aplicare:

- **Rapiță:** de la formarea a 4-9 frunze până la înflorit;
- **Floarea-soarelui:** începând cu stadiul de 4 frunze ale culturii;
- **Porumb:** începând cu stadiul de 4 frunze până la formarea bobului;
- **Vărzoase:** când aparatul foliar este suficient de dezvoltat pentru o absorbție eficientă a produsului până la 4 săptămâni înaintea recoltării;
- **Leguminoase:** când aparatul foliar este suficient de dezvoltat pentru o absorbție eficientă a produsului până la 4 săptămâni înaintea recoltării.

Număr de tratamente: 1-2/3 tratamente.

Interval între tratamente: 10-14 zile.

Volumul de apă/ha: 200-400 litri de apă pe hectar.



FMC și Rapsin™ sunt mărci comerciale ale FMC Corporation și / sau ale unui afiliat.