



Successor® TX /Koban® TX | erbicid

Erbicid selectiv preemergent și postemergent timpuriu pentru combaterea buruienilor graminee și cu frunză lată din culturile de porumb și floarea-soarelui.

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ	petoxamid 300 g/l + terbutilazină 187,5 g/l
FORMULARE	suspoemulsie concentrate (SE)
CERTIFICAT DE OMOLOGARE ÎN ROMÂNIA	Nr. 149 PC din 16.03.2016

AVANTAJE:

- Este soluția eficientă și de lungă durată pentru combaterea buruienilor graminee și a unor buruieni cu frunză lată.
- Spectru larg de buruieni combătute.
- Acționează în stratul superficial al solului, chiar și la cantități mai reduse de precipitații.
- Selectiv pentru cultura de porumb și floarea-soarelui.

Produsul Successor® TX / Koban® TX este omologat pentru:

CULTURĂ	ORGANISM ȚINTĂ	DOZĂ/HA
Porumb	Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale	3,0 - 4,0 l/ha preemergent și postemergent
Floarea-soarelui		3,0 - 4,0 l/ha preemergent

MOD DE ACȚIUNE:

- Erbicidul Successor® TX / Koban® TX este erbicid cu acțiune peliculară, dacă se aplică preemergent, sau cu acțiune sistemică și de contact, dacă se aplică postemergent timpuriu. Se absoarbe prin rădăcini și coleptil.
- Pentru o eficiență foarte bună, erbicidul Successor® TX / Koban® TX trebuie aplicat pe sol umed sau cu umiditate suficientă pentru a forma o peliculă uniformă.
- Buruienile afectate prezintă cloroză și ulterior necroză pe vârfuri și marginile frunzelor și sunt combătute complet în 2 - 3 săptămâni după aplicare.



MOD DE UTILIZARE:

- Erbicidul Successor® TX / Koban® TX se aplică
 - preemergent la porumb și floarea-soarelui la un stadiu de dezvoltare BBCH 00-08/09 sau
 - postemergent timpuriu numai la porumb până la 6 frunze (BBCH 10-16), singur sau asociat cu un graminicid (Innovate® 240 SC).
- Efectul maxim se obține în condiții de pregătire bună a patului germinativ, bine mărunțit în primăvară după o aratură corespunzătoare de toamnă, fără bulgări.
- Erbicidul Successor® TX / Koban® TX se recomandă la toate soiurile de porumb pentru boabe sau siloz și este potrivit pentru toate sistemele de cultivare a florii-soarelui (clasică, Express®, pe bază de imazamox).
- Volumul de apă: 200 - 400 l/ha.

SPECTRUL DE BURUIENI COMBĂTUTE:

<i>Amaranthus retroflexus</i> (știr)	<i>Matricaria chamomilla</i> (mușețel)
<i>Bidens tripartita</i> (dentiță)	<i>Panicum miliacenum</i> (mei)
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (traista ciobanului)	<i>Papaver rhoeas</i> (mac roșu de câmp)
<i>Chenopodium spp.</i> (spanac sălbatic)	<i>Poa annua</i> (firuță)
<i>Digitaria sanguinalis</i> (meișor)	<i>Polygonum spp.</i> (hrișcă, ardeiul broaștei)
<i>Datura stramonium</i> (ciumăfaie)	<i>Setaria spp.</i> (mohor)
<i>Echinochloa crus-galli</i> (iarbă bărboasă)	<i>Sorghum halepense</i> (costrei)
<i>Fumaria officinalis</i> (fumărița)	<i>Solanum nigrum</i> (zârnă)
<i>Galinsoga parviflora</i> (busuioc sălbatic)	<i>Stellaria media</i> (rocoină)
<i>Galium aparine</i> (turiță)	<i>Thlaspi arvense</i> (punguliță)
<i>Geranium pusillum</i> (ciocul berzei)	<i>Veronica spp.</i> (ventrilică)
<i>Lamium purpureum</i> (sugel puturos)	<i>Viola arvensis</i> (viorele de ogoare)



FMC și Successor® TX / Koban® TX sunt mărci comerciale ale FMC Corporation și / sau ale unui afiliat.