



Targa® Max | erbicid

Erbicid selectiv pentru combaterea buruienilor graminee anuale și perene din culturile de floarea-soarelui, rapiță, cartof, soia, sfeclă de zahăr, mazăre, fasole, morcov și tomate.

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ	quizalofop-p-etil 100 g/l
FORMULARE	emulsie concentrată (EC)
CERTIFICAT DE OMOLOGARE ÎN ROMÂNIA	Nr. 254PC din 19.12.2016

AVANTAJE:

- Se translocă rapid până la nivelul sistemului radicular al buruienilor.
- Combate buruieni graminee anuale și perene.
- Reduce rezerva de rizomi.
- Nu are remanență în sol.
- Nu restricționează rotația culturilor.

Produsul Targa® Max este omologat pentru:

CULTURĂ	ORGANISM ȚINTĂ	DOZĂ/HA	MOMENTUL APLICĂRII
Floarea-soarelui	graminee anuale: <i>Setaria sp</i> (mohor), <i>Echinochloa crus-galli</i> (iarbă bărboasă), samulastră de cereale	0,4 - 0,5 l/ha	Postemergent: graminee anuale 4-6 frunze; graminee perene <20cm
	graminee perene: <i>Sorghum halepense</i> (costrei), <i>Agropyron repens</i> (pir târâtor)	0,5 - 0,6 l/ha	
Cartof	graminee anuale: <i>Setaria sp</i> (mohor), <i>Echinochloa crus-galli</i> (iarbă bărboasă), samulastră de cereale	0,4 - 0,6 l/ha	
	graminee perene: <i>Sorghum halepense</i> (costrei), <i>Agropyron repens</i> (pir târâtor)	0,6 - 1,0 l/ha	
Rapița de toamnă Soia Sfeclă de zahăr Mazăre Fasole Morcov Tomate	graminee anuale: <i>Setaria sp</i> (mohor), <i>Echinochloa crus-galli</i> (iarbă bărboasă), samulastră de cereale	0,4 - 0,5 l/ha	
	graminee perene: <i>Sorghum halepense</i> (costrei), <i>Agropyron repens</i> (pir târâtor)	0,6 - 1,25 l/ha	

* ®Produs marcă înregistrată Nissan Chemical Industries, Tokyo, Japonia



MOD DE ACȚIUNE:

- Targa® Max este un erbicid sistemic din clasa arilfenoxypropionați care, în câteva ore de la aplicare, este absorbit și transmis prin vasele libero-lemnoase, inhibând biosinteza acizilor grași.
- Ajuns în rădăcini, se acumulează în mugurii subterani, rizomii și stolonii gramineelor perene și distruge țesuturile meristematice.
- Este selectiv față de speciile cu frunză lată la care translocarea este foarte limitată, iar produsul rămâne în zona frunzelor tratate.

MOD DE UTILIZARE:

- Targa® Max controlează buruieni graminee anuale precum *Avena fatua* (ovăz sălbatic), *Alopecurus myosuroides* (coada vulpii), *Setaria spp.* (mohor), *Echinochloa crus-galli* (iarba bărboasă), perene cum ar fi *Sorghum halepense* (costrei), *Agropyron repens* (pir târâtor), inclusiv samulastră de cereale.
- Se recomandă utilizarea postemergentă pentru combaterea buruienilor graminee anuale în doză de 0,4 lt/ha și perene, inclusiv *Sorghum halepense* (costrei) din rizomi și *Agropyron repens* (pir târâtor) în doză de 0,75 lt/ha.
- Produsul se aplică în primele faze de dezvoltare a culturii, astfel încât soluția de stropit să ajungă pe buruienile țintă înainte de acoperirea completă a rândurilor.
- Pentru combaterea costreii se recomandă aplicarea în perioada când plantele de *Sorghum halepense* au înălțimea de 10 - 25 cm.
- Se evită deriva erbicidului pe culturile de porumb, cereale păioase, borcea sau suprafețe însămânțate cu specii graminee.
- Volumul de soluție: 200 - 400 l/ha.



FMC și Targa® Max sunt mărci comerciale ale FMC Corporation și / sau ale unui afiliat.