



Venzar[®] 500 SC | erbicid

Erbicid pentru combaterea buruienilor cu frunză lată anuale și unele graminee anuale la sfecla de zahăr.

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ	lenacil 500 g/l
FORMULARE	suspensie concentrată (SC)
CERTIFICAT DE OMOLOGARE ÎN ROMÂNIA	Nr. 2777 din 27.03.2008

AVANTAJE:

- Spectru larg de buruieni combătute.
- Aplicare flexibilă în postemergență.
- Acțiune reziduală în sol pe o durată de până la 3 luni.
- Fără restricții de rotație a culturilor, după 4 luni de la aplicare.
- Compatibil cu alte erbicide.

Produsul Venzar[®] 500 SC este omologat pentru:

CULTURĂ	ORGANISM ȚINTĂ	DOZĂ/HA
Sfecla de zahăr și sfecla furajeră	Buruieni dicotiledonate anuale	1 l/ha

MOD DE ACȚIUNE:

- Erbicid selectiv postemergent pentru combaterea buruienilor anuale cu frunză lată și unele graminee.
- Absorbit prin rădăcinile în creștere ale plantelor, inhibă fotosinteza.
- Acționează asupra buruienilor în curs de răsărire.

MOD DE UTILIZARE:

- Erbicidul Venzar[®] 500 SC se aplică postemergent în una, două, trei sau patru aplicări, în așa fel încât, doza maximă cumulată, folosită într-un sezon, să nu depășească 1 l/ha.
- Erbicidul Venzar[®] 500 SC se poate amesteca în rezervorul mașinii la doza de 0,25 - 0,50 l/ha/tratament cu Safari[®], ori cu produse pe bază de fenmedifam, desmedifam, metamitron sau clopiralid în funcție de speciile de buruieni răsărite în cultură.

- În funcție de spectrul, gradul de îmburuienare, mărimea buruienii, stadiul culturii, partenerul de amestec, condițiile climatice, poate fi aplicat după diferite scheme de tratament:
 - 1 l/ha erbicid Venzar® 500 SC, aplicat singur când plantele de sfeclă au format minimum 4 frunze, iar buruienile sunt mici, abia răsărite (cotiledoane - 2 frunze)
 - 0,5 l/ha erbicid Venzar® 500 SC la primul tratament când sfecla a format 2 - 4 frunze, iar buruienile sunt mici, în faza de cotiledoane - 2 frunze, urmat de un tratament cu doza de 0,5 l/ha sau două tratamente cu doza de 0,25 l/ha;
 - 0,25 l/ha erbicid Venzar® 500 SC la primul tratament, după răsărirea sfeclei de zahăr, în amestec cu erbicidul Safari® (30 g/ha) sau alte erbicide omologate, urmat de unul, două sau trei tratamente cu 0,25-0,50 l/tratament, în funcție de buruienile răsărite și gradul de îmburuienare.

SPECTRUL DE BURUIENI COMBĂTUTE:

BURUIENI SENSIBILE	<i>Polygonum lapathifolium</i> (iarbă roșie)
<i>Agrostis</i> spp. (păiuș)	<i>Polygonum persicaria</i> (ardeiul broaștei)
<i>Alopecurus myosuroides</i> (coada vulpii)	<i>Ranunculus arvensis</i> (piciorul cocoșului)
<i>Anagalis arvensis</i> (scânțeuță)	<i>Raphanus raphanistrum</i> (ridiche sălbatică)
<i>Anthemis</i> spp. (romaniță)	<i>Senecio vulgaris</i> (spălăcioasă)
<i>Apera spica-venti</i> (iarba vântului)	<i>Sinapis arvensis</i> (muștar sălbatic)
<i>Atriplex patula</i> (talpa găștei)	<i>Spergula arvensis</i> (hrana vacii)
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (traista ciobanului)	<i>Stachys</i> spp. (jaleș de câmp)
<i>Chenopodium album</i> (lobodă albă)	<i>Stellaria media</i> (rocoină)
<i>Digitaria sanguinalis</i> (meișor)	<i>Thlaspi arvense</i> (punguliță)
<i>Fumaria officinalis</i> (fumăriță)	<i>Veronica persica</i> (ventriliță)
<i>Galeopsis tetrahit</i> (lungurică)	BURUIENI REZISTENTE
<i>Galinsoga parviflora</i> (busuioc sălbatic)	<i>Agropyron repens</i> (pir târâtor)
<i>Lamium</i> spp. (sugel)	<i>Avena fatua</i> (odos)
<i>Matricaria</i> spp. (mușețel sălbatic)	<i>Cirsium arvense</i> (pălămidă)
<i>Myosotis arvensis</i> (nu-mă-uita)	<i>Galium aparine</i> (turîță)
<i>Papaver rhoeas</i> (mac sălbatic)	<i>Solanum nigrum</i> (zârnă)
<i>Poa</i> spp. (firuță)	<i>Veronica hederifolia</i> (doritoare)
<i>Polygonum convolvulus</i> (troscot)	<i>Viola arvensis</i> (trei frați pătați)

FMC și Venzar® 500 SC sunt mărci comerciale ale FMC Corporation și / sau ale unui afiliat.